



(01)08806447003107

위궤양, 위염치료제

레바신
(레바미피드) 정전문의약품
분류번호 : 232

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분: 레바미피드(KP) 100mg
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 히드로시프로필셀룰로오스, 저자활도히드로시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 스테아로산마그네슘, 탤크, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄

【성상】 흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성 위염, 만성위염의 급성악화기

【용법·용량】

- 성인 레바미피트로서 1회 100mg을 1일 3회 경구투여한다. 다만, 위궤양의 경우에는 아침, 저녁 및 취침전에 투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약 성분에 과민반응 병력 환자

2. 이상반응

여기서 '드물게'는 0.1%미만을, '때때로'는 0.1~5%미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5%이상 또는 빈도불명을 의미함.

1) 중대한 이상반응

- (1) 소크, 아나필락시스모양 증상(빈도불명): 소크, 아나필락시스모양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- (2) 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명): 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

- (3) 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명): AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 기타 이상반응

- (1) 과민반응: 두드러기, 드물게 발진, 가려움, 악진양 습진 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에 는 투여를 중지한다.

(2) 정신신경계: 마비, 어지러움, 출음이 나타날 수 있다.

(3) 소화기계: 구강, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있다.

(4) 간: 드물게 AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등 아미노전달 효소가 현저히 상승한 경우나 발열, 발진 등이 동시에 나타난 경우는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

(5) 혈액계: 혈소판 감소, 때때로 백혈구 분획증, 분열핵 구의 감소, 림프구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소가 나타날 수 있다.

(6) 기타: 유선증장, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유발, 심계항진, 발열, 안면홍조, 허의 마비, 기침, 호흡곤란, 탈모 또는 드물게 월경이상, BUN 상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

- 2) 동물실험에서 모유증으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유율을 피한다.

4. 소아에 대한 투여

- 저체중출생아, 신생아, 유아, 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.)

5. 고령자에 대한 투여

- 고령자에 있어서 확인된 이상반응 종류 및 이상반응 발현율은 비교령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 이상반응에 주의한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

【사용기한】 직접용기에 별도표기

【포장단위】 30정/병, 100정/병

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변파오순된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나 제품상담전용전화를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.
- 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.