

명·부기·타박상  
**타바자겔**



KGMP  
일반의약품  
분류번호: 264

**[성상]** 무색 투명한 균질한 겔제

**[원료약품 및 분량]** (이 약 1g 중)

(유효성분)

헤파린나트륨(JP)(돼지, 장점막) .....	400.0IU
무정형에스신(KP) .....	10.0mg
살리실산글리콜(KP) .....	20.0mg

(기타첨가제)

농글리세린, 라벤더향(SJ-F), 에데트산나트륨수화물, 이소프로판올, 정제수, 카보머940, 트롤아민

**[용법·용량]** 상처나 감염된 부위에 1일 수회(여러 차례) 얇게 바른 후 피부를 가볍게 문질러준다.

**[효능·효과]** 다음 증상의 진통·소염(항염) : 정맥류상 부종(부기), 포자성(표면에 있는) 정맥염, 사고시 외상(상처), 운동시 부상(타박상), 건초염(힘줄윤활막염)

**[사용상의 주의사항]**

1. 다음과 같은 사람(신체 부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 살리실산염 과민반응 환자
- 2) 출산일 4주전 환자
- 3) 점막부위, 개방된 상처부위
- 4) 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 신생아 및 소아(광범위한 피부표면에 대해 장기간 사용하지 않는다)
- 2) 신(신장)부전 환자(살리실산염은 피부를 통해 많은 양이 흡수된다. 특히 신(신장)기능장애의 경우에는 중독증상이 나타날 수 있으므로 신(신장)부전증 환자의 넓은 피부표면에 대해 장기간 사용하지 않는다)
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(살리실산염은 피부를 통하여 많은 양이 흡수되어 중독증상이 나타날 수 있으므로 넓은 피부표면에 대한 임부의 장기간의 사용은 피한다)
- 4) 수유부(이 물질은 모유를 통하여 신생아로 전달될 수 있으므로 유방부위에는 사용하지 않는다)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 드물게 피부염이 나타날 수 있다.
- 2) 드물게 접촉 알레르기가 나타날 수 있다.
- 3) 이 약이 흡수시 살리실산의 혈청치가 300mg/L 이상인 경우 중독증으로 간주된다. 초기증상으로는 청각장애를 동반한 이명(귀울림)증, 코피, 구역, 구토, 가려움 및 피부 점막의 건조증이 나타난다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용할 것.
- 3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의할 것.
- 4) 고통도로 광범위하게 외용할 경우에 메토트렉세이트의 독성을 증강시킬 수 있다.
- 5) 설포닐 요소에 의한 저혈당 증상이 심해질 수 있다.
- 6) 다른 국소부위에 사용된 약물의 투과성이 상승될 수 있다.

- 7) 헤파린나트륨은 다른 혈액응고저지제(예, 쿠마린, 아스피린, 디피리다몰, 덱스트란, 스트렙토키나제 등)와 함께 사용시 출혈이 증가할 수 있다.
- 8) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.
- 9) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다. 증상이 심한 경우에는 안과의사의 치료를 받을 것.
- 10) 너무 넓게 바르지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 의약품용 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

**[포장단위]** 20g / 튜브

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

**[최종개정년월일]** 2017.08.23

※ 기타 안내사항은 SK케미칼(주)에 따름 (제조사 : 시믹씨엘오코리아(주), 판매자 : SK케미칼(주))

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 제품 상담 전용 전화(080-021-3131)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 사항은 '온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)'에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)