



바이러스 피부질환 치료제

# 아크로빈

크림  
아시클로버

※【원료약품 및 그 분량】 1g 중

- 유효성분: 아시클로버(BP) ..... 50mg
- 첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP) ..... 0.8mg  
파라옥시벤조산프로필(KP) ..... 0.4mg
- 기타첨가제: 프로필렌글리콜, 카보머 940, 트롤아민, 세탄올, 스테아릴알코올, 미리스트산이소프로필, 폴리소르베이트 60, 소르비坦스테아레이트, 디메티콘, 정제수

【성상】 전질이 고른 흰색의 크림제

## 【효능 · 효과】

단순 포진(물집) 바이러스 감염증(초기 및 재발성 생식기 포진(물집)과 구순(입술) 포진(물집) 포함)

## 【용법 · 용량】

1. 이 약은 약 4시간 간격으로 1일 5회 환부(질환부위)에 바른다.
2. 치료는 5일간 계속하여야 하며, 5일간 사용 후에도 치료되지 않을 경우에는 5일간 더 사용할 수 있다.

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
  - ① 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있거나 화학적 불내성 환자
  - ② 수유부
  - ③ 소아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
  - ① 에이즈 환자 또는 골수이식 환자 등 면역결핍 환자
  - ② 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
  - ① 궤양이 생긴 생식기 부위의 특성상 이 약의 사용으로 인해 압통(누르는 통증) 등의 불쾌감을 느낄 수 있다.
  - ② 일시적인 작열감(화끈감), 자통(찌르는 것 같은 아픔)을 포함하는 가벼운 동통(통증) 및 접촉피부염, 홍반(붉은반점)성 발진, 습진, 알레르기반응 및 때때로 도포(바르다)부위의 자극감, 가려움, 외음증, 안면부종(얼굴부기), 피부 탈색, 두드러기, 발진, 소수포성 발진이 나타날 수 있다.
  - ③ 홍반(붉은반점), 가려움이 나타나거나 피부가 약간 건조해지고 벗겨질 수 있다.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질 · 변파 · 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.skchemicals.com/ls](http://www.skchemicals.com/ls))나 제품상담 전용전화를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.



2002. 4. 작성  
※2016. 12. 19. 개정  
(Ver.006)

자세한 문의는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료) : 080-021-3131

#### 4. 일반적 주의

- ① 치료는 가능한 한 초기에 시작하고, 재발성인 경우에는 전구증상 또는 병소(아픈부위)가 처음 나타날 때 시작하는 것이 바람직하다.
- ② 정해진 용법 · 용량 및 투여기간을 지키고, 징후나 증상이 없는 사람에게는 사용하지 않는다.
- ③ 이 약은 타인으로의 감염이나 재발성 단순포진(단순물집) 감염증의 예방 목적으로 사용하지 않는다.
- ④ 이 약의 내성 발생에 대한 근거는 없으나 그 가능성을 배제할 수는 없다.
- ⑤ 이 약물을 희석(묽게함)하거나 다른 약물을 혼합하기 위한 기제로 사용하지 않는다.

#### 5. 상호작용

이 약과 연관성은 밝혀지지 않았으나, 전신투여한 아시클로버의 혈장 반감기 및 AUC가 프로베네시드에 의해 증가하였다.

#### 6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- ① 토끼, 렛트, 마우스 등에 아시클로버를 전신 투여한 동물실험에서 기형발생은 관찰되지 않았으나, 렛트의 모체에 신장애(신장장애)를 유발할 정도의 용량을 피하 투여시, 태자의 머리 및 꼬리의 이상이 나타났다.
- ② 임부에 대한 투여 경험이 많지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 사용한다.
- ③ 이 약 사용 중에는 수유를 하지 않는다(전신투여 후 아시클로버가 유즙 중으로 분비된다는 보고가 있다).

#### 7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

#### 8. 적용상의 주의

- ① 이 약은 외용으로만 사용한다.
- ② 안과용으로 각막, 점막에 사용하지 않는다.
- ③ 이 약을 입이나 눈 또는 질과 같은 점막에 사용할 경우, 자극감이 나타날 수 있다.
- ④ 이 약이 신체의 다른 부위로 퍼지거나 타인에게 감염시키는 것을 방지하기 위해 골무나 고무장갑을 낀 상태에서 바른다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【사용기한】 직접용기에 별도표기

\* 【포장단위】 1개/튜브(5g)