

광범위 피부질환 치료제

# 엘스킨 크림

일반의약품  
분류번호: 264

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

• 유효성분:

베타메티손발레레이트(KP) ..... 0.61mg  
겐타마이신황산염(KP) ..... 1mg(여기)

• 첨가제(보조제):

파라옥시벤조산메틸(KP) ..... 1mg  
파라옥시벤조산프로필(KP) ..... 1mg

• 기타첨가제: 글리세린모노스테아레이트, 폴리소르베이트 60, 팜이트산세틸, 세탄올, 스테아릴알코올, 미리스틴산 이소프로필, 인산이수소나트륨, 인산, 정제수

【성상】 전질균등한 흰색의 크림

【효능 · 효과】

• 2차 감염된 알레르기성 또는 엄증성 피부질환: 습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염, 만성단순태선, 간찰진(피부스침증), 박탈피부염, 가려움, 건선(건선, 마른비늘증)

• 1도 화상

【용법 · 용량】

1일 1~3회 환부(질환부위)에 적당량을 바른다.

※【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 세균(결핵, 매독 등) · 진균(곰팡이)(칸디다증, 박선 등)  
· 스피로피데타속 · 헤모 · 바이러스(대상포진(물집)), 단순포진(물집), 수두, 종두증 등 · 동물옴, 사면발이 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 2) 이 약 또는 이 약 성분에過민증 및 그 병력이 있는 환자
- 3) 고막천공(뚫림)이 있는 습진성 외이도염 환자(천공(뚫림) 부위의 치유지연이 나타날 수 있다.)
- 4) 귀양(베체트병 제외), 제2도 심재성(드러나지 않는) 이상의 화상 · 동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다.)
- 5) 입주위피부염, 보통여드름, 주사(rosacea) 환자
- 6) 스트렙토마이신, 카나마이신, 겐타마이신, 네오마이신 등 아미노글리코사이드계 항생물질 또는 바이트라신에 의한 과민증 및 그 병력이 있는 환자 (아미노글리코사이드계 항생물질사이에에는 교차 알레르기 유발성이 입증되었다.)

• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변질 · 변색 · 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.

• 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.skchemicals.com/ls](http://www.skchemicals.com/ls))나 제품상담 전용전화를 통하여 확인할 수 있습니다.

• 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

• 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.

• 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.



제조의뢰자

Life Science Biz.

에스케이케미칼(주)

충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149



제조자

CMIC

Pharmaceutical Value Creator

경기도 부천시 옥산로 230번길 23

2000. 11. 작성

※2020. 4. 21. 개정

(Ver.007)

자세한 문의는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료): 080-021-3131

- 2) 내분비계: 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉붕대법에 의해 코르티코이드 전신투여와 같은 노하수제·부신(콩팥위생)피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다.
- 3) 눈: 안검(눈꺼풀) 피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉붕대법을 사용할 경우 후난하 백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있다. 빈도불명의 시야흐름이 나타날 수 있다.
- 4) 균교대현상: 국소적용 형성물질제제를 장기간 사용한 경우에 때때로 진균(곰팡이)을 포함하는 비감수성균의 균교대감염(superinfection)을 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지하고 적절한 치료를 한다.
- 5) 신장장애(신장장애), 난청(귀먹음)등이 나타날 수 있으므로 장기 연용(계속 복용(사용))을 피한다.
- 4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항**
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
  - 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다.
  - 3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 가역적인 사상하부-노하수체-부신(콩팥위생)(HPA) 축의 억제, 쿠싱증후군, 고혈당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 밀봉붕대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요증에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제를 검사 한다.
  - 4) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었다면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 활성이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다.
  - 5) 치료기간은 질환의 정도나 병소(아픈 부위)의 부위, 환자의 반응에 따라 다르다. 그러나 3~4주 치료 후에도 증상이 개선되지 않으면 다른 질환을 의심해 보아야 한다. 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.
  - 6) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.
  - 7) 대량, 장기간, 광범위하게 특히 밀봉붕대법을 사용함으로써 코르티코이드제를 전신적으로 투여한 경우와 같은 증상이 나타날 수 있다. 특별한 경우를 제외하고는 장기, 대량사용 및 밀봉붕대법을 피한다.
  - 8) 감작(과민상태로 만듦)경후(발적(충혈되어 붉어짐)), 부종(부기), 구진, 소수포(물진/진물진) 등이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
  - 9) 장기연용(계속 복용(사용)) 하지 않는다.
  - 10) 코르티코이드 및 겐타마이신은 밀봉붕대법 또는 광범위한 부위 적용, 장기연용(계속 복용(사용))등으로 인해 피부를 통해 흡수된다고 알려져 있다. 이러한 경우에는 정기적인 관찰 및 치료에 앞서서 BUN 검사 등을 통한 신기능 검사가 권장된다.
  - 11) 겐타마이신 국소투여시 전신적인 효과가 나타나지 않지만, 전신독성을 나타낼 수 있는 농도에서는 신부전환자 또는 제8뇌신경환자에서는 영구적인 전정(前庭)기능장애(평형기능장애)의 원인이 될 수 있다.
  - 12) 임부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돎)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
  - 13) 국소적으로 투여된 코르티코이드가 모유로 이행 되는지 여부는 알려져 있지 않으나 전신적으로 투여된 코르티코이드가 모유증으로 이행되므로 수유부에 투여시 주의하여야 하며, 수유부에 대한 이 약의 투여가 필요한 정도를 고려하여 수유를 중지하거나 이 약의 투여를 중지한다.
- 14) 소아는 제중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다. 국소적용 코르티코이드로 치료받은 소아에게서 HPA축억제, 쿠싱증후군, 발육장애, 체중증가의 징후 및 두개골(머리뼈)내고혈압의 발생이 보고된 바 있다. 소아에게서 발견되는 부신(콩팥위생)억제의 징후는 혈장 코르티솔 수치가 낮아지고 ACTH 자극에 반응이 없는 것이다. 두개골(머리뼈)내고혈압의 징후로는 숫구멍의 돌출(bulging fontanelle), 두통 및 양쪽시신경 유두부종(부기)(papilledema)이 있다.
- 15) 기저귀 등은 밀봉붕대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.
- 16) 소아환자에게 사용할 경우에는 치료 효과를 나타내는 최소증량을 사용한다.
- 17) 국소용 코르티코이드의 과다사용 또는 장기사용 시 노하수체-부신(콩팥위생)기능을 억제하여 2차적인 부신(콩팥위생)기능부전증을 유발하고 쿠싱증후군을 포함하는 고코르티솔혈증을 유발시킬 수 있다. 겐타마이신을 국소로 과다 또는 장기간 사용하였을 때는 병소부에 진균(곰팡이) 또는 비감수성균의 과도한 증식이 일어날 수 있다.
- 이러한 경우 적절한 대증적 치료가 필요하다. 급성 고부신피질호르몬증상(hypercorticoid symptoms)은 보통 가역적이다. 필요할 경우 전해질 불균형을 치료하여야 한다. 만성독성인 경우 코르티코이드를 서서히 감량하여 중단하여야 한다.
- 18) 건선(마른비늘증)환자에 장기, 대량 사용할 경우에는 치료 중 또는 치료중지 후에 건선(마른비늘증)성 홍피증(선흥피부증), 농포(고름물집)성 건선(마른비늘증) 등이 나타나는 보고가 있다.
- 19) 이 약은 안식향산(나트륨)을 포함하고 있어 피부, 눈, 점막에 경미(가벼운, 대수롭지 않은)한 자극이 될 수 있다.
- 20) 전신 및 국소 코르티코이드 사용 시 시각장애가 보고될 수 있다. 만약, 환자에서 시야흐름 또는 기타 시각장애와 같은 증상이 나타나면, 전신 및 국소 코르티코이드 사용 후에 보고되었던 백내장, 녹내장 또는 중심성장액막망막병증 (central serous chorioretinopathy (CSCR))과 같은 드문 질환을 포함하여 시각장애를 일으킬 수 있는 원인을 확인하기 위하여 안과전문의에게 진료받을 것을 고려해야 한다.
- 5. 적용상의 주의**
- 1) 안과용으로 사용하지 않는다.
  - 2) 화장이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
  - 3) 의사의 감독없이 밀봉붕대법을 사용하지 않는다(특히 밀봉붕대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용 전에 환부(질환부위)를 청결히 한다).
- 6. 저장상의 주의사항**
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 2) 의약품을 원래 용기에서 끼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
- [저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C)보관  
**[사용기한]** 직접용기에 별도표기  
**[포장단위]** 1개/튜브(30g)