



기넥신·에프

정

은행염엑스

일반의약품

분류번호 : 219

기넥신-에프는 SK생명과학연구소에서 개발한 특허방법으로 푸른은행염을 원료로하여 만든 천연생약제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

주성분 : 은행염엑스(KPC) 40.0mg

착색제 : 황색 203호(KPC) 적량

착색제 : 식용색소 착색제1호 알루미늄레이크(식첨) ...적량

【성 상】 진녹색의 타원형 필름 코팅정

【작 용】

1. 기넥신-에프 : 혈관벽 손상방지 작용

혈관세포를 파괴하여 혈관의 경화를 가속화하는 자유기 (Free Radical)를 억제하므로 혈관을 보호하고 탄력성을 유지시킵니다. (Presse Med. Sep 25 1986, 15(31) 1475-9)

2. 기넥신-에프 : 혈액점도 저하작용

혈액의 점도를 증가시키는 혈소판의 응집기전을 억제하여, 혈액의 점도를 낮추어 혈액순환을 원활하게 합니다.

(Cinkgolides-Chemistry, Biology, Pharmacology and Clinical Perspectives)

3. 기넥신-에프 : 말초혈관 확장작용

혈관확장인자(EDRF, PGI₂)를 유리하여 혈류공급이 부족한 부위의 혈관을 확장시켜 혈류량을 증가시킵니다.

(Presse Med. Sep 25 1986, 15(31) 1524-8)

【효능·효과】

1. 주요효능과

- ① 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료
- ② 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
- ③ 이명, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

· 성인

- ① 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명 : 은행염엑스로서 (1회 40mg 1일 3회) 또는 (1회 80mg 1일 2회) 경구투여한다.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 꾀한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skpharma.com)나 제품상담전문전화로 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보' 를 참조하십시오.



충청북도 청주시 흥덕구 송정동 1-6

자세한 문의를 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료) : 080-021-3131

② 기질성 뇌기능장애 : 은행염엑스로서 (1회 40mg~80mg 1일 3회) 또는 (1회 120mg 1일 2회) 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- ① 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약에 과민증 환자
- ② 부작용
드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
- ③ 일반적 주의
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.³⁾
- ④ 임부에 대한 투여
동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용 경험이 적다.
- ⑤ 소아에 대한 투여
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
- ⑥ 저장상의 주의사항
직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

【저장방법】

- ① 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관
- ② 오용을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10, 100, 300, 1000정

주) 이 약은 혈압강화제가 아니므로 혈압조절이 요구되는 고혈압 환자는 혈압강화 목적으로 본 제제만을 단독 투여하지 마십시오.

1991. 9. 작성
* 2009. 8. 19. 개정



Ginexin-F Tab.

Ginexin-F is a natural herb medicine extracted from green Ginkgo biloba leaves by method of SK Chemical's patent.

[Description]

Each tablet contains 40mg Ginkgo biloba extracts
The tablet is film coated, dark green colored, elliptic shape.

[Indication]

- ① Circulatory disorders of peripheral arteries. (Intermittent Claudication)
- ② Dizziness, vascular or/and degenerative tinnitus.
- ③ Organic disorders of cerebral function accompanying demential symptoms such as tinnitus, headache, memory loss, concentration disturbance, depressive mood, dizziness.

[Dosage]

• Adult

- ① Circulatory disorders of peripheral arteries, dizziness, tinnitus : take 40mg three times or 80mg twice a day.
- ② Organic disorders of cerebral function : take 40mg-80mg three times a day or 120mg twice a day.

[Precaution]

- ① Contraindication
Patient with hypersensitivity to this medicine
- ② Adverse reaction
Mild gastrointestinal discomfort, headache, allergic skin irritation
- ③ General Precaution
Since it is not anti-hypertensive agent, do not administer this medicine to hypertensive patient who require special care instead of anti-hypertensive agent.
- ④ Pregnant woman
There are not enough experiences for pregnant woman even if no teratogenesis was found in animal studies.
- ⑤ Children
Do not use this medicine to children under 12-year-old due to lack of experiences.
- ⑥ Storage Precaution
Protect from direct sunlight and preserve in cool and dry place.

[Storage]

Store in tight container at room temperature.

[How Supplied]

10, 100, 300, 1000tablets

[Period of Validity]

36 months