기넥신에프40mg100정:96x50x65

pantone 286 | pantone 158 | pantone 485 | pantone 871 | pantone 347 | 검정 | 칼선

기넥신녹색

【상상】 진녹색의 타원형 필름 코팅정

주) 이 약은 밝은갈색이 아니므로 밝은적갈색 특이한 고형물, 혼탁한 물질이 있을 수 있음.

• 첨부문서 작성기준 지침에 따라 보완된 내용은 식품의약품안전처(www.skchemicals.com/kr/나 제품상담전화(080-022-3131)를 통하여 확인할 수 있습니다.

• 본 의약품을 사용하기 전에 본 제품을 처음 사용하는 의약품과 함께 복용하는 모든 처방 사용중인 의약품 및 건강기능식품 섭취 후 부작용이 발생하면 즉시 섭취하여 주십시오.

• 제품 사용 중 부작용이 발생하거나 의약품 복용 후 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우, 이상반응 이 드물게 기재된 위험성, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다, 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례의 비례 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다.

• 어지러움 • 기립성증 3) 기타: 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로서 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 주의사항: 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의 사항: 첨부문서 참조

일반의약품정보

이 약을 사용하기전 반드시 첨부문서를 확인하세요

【유효성분】 **1정 중**

은행엽건조엑스(생규) 40mg

【첨가제】

• 첨가제타르색소): 황색203호알루미늄레이크, 식용색소청색제호알루미늄레이크
• 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 무수인산수소칼슘, 정절무수규산, 스테아르산마그네슘, 벌크, 히프로멜로오스2910, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄

【효능·효과】 1. 주요효능효과

① 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료 ② 어지러움, 현관성 및 토행성 이명(귀울림) ③ 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

① 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림), 은행엽건조엑스로서 **1회 40mg 1일 3회** 또는 **1회 80mg 1일 2회** 경구투여한다(먹는다. 복용한다), ② 기질성 뇌기능장애: 은행엽건조엑스로서 **1회 40mg~80mg 1일 3회** 또는 **1회 120mg 1일 2회** 경구투여한다(먹는다. 복용한다), 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

성인	

【저장방법】 • 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 • 어린이의 손에 닿지 않게 보관하세요.

【사용기한】 용기 측면 표시일까지

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것: 이 약에 과민증 환자, 12세 이하의 소아, 임부

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것: 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용하고 있는 환자, 수유부

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것: 이 약 및 것, 상담시 기능한 첨부문서를 소지할 것: 수술이 예정된 자, 복용 3개월 후 증상이 개선이 없거나 악화되는 경우, 이상반응 i) 드물게 기재된 위험성 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다, 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례의 비례 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다.

• 어지러움 • 기립성증 3) 기타: 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로서 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 주의사항: 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의 사항: 첨부문서 참조

혈액순환장애 및 어지러움 개선

기넥신·에프 정

은행엽건조엑스

SK 케미칼 제조원
Life Science Biz.
에스케이케미칼(주)
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149

Ginexin·F Tab.

혈액순환장애 및 어지러움 개선

기넥신·에프 정

은행엽건조엑스

SK

40mg

100정

Ginexin Ginexin Ginexin Ginexin

기넥신·에프 정

일반의약품 KGMP 적격업소제품

• 제조번호, 사용기한 아래표기

Ver. 014