



전문 의약품
분류번호 : 214

【원료약품 및 그 분량】이 약 1정 중

- **코스카정**
 - 유효성분: 로사르탄칼륨(USP)50mg
(로사르탄으로서 45.8mg)
- 기타첨가제: 유당수화물, 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 전호화 전분, 스테아르산마그네슘, 오파드라이한색(YS-1-7040), 카르나우바납
- **코스카정100mg**
 - 유효성분: 로사르탄칼륨(USP)100mg
(로사르탄으로서 91.6mg)
- 기타첨가제: 유당수화물, 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 전호화 전분, 스테아르산마그네슘, 오파드라이한색(YS-1-7040), 카르나우바납

【성상】 흰색의 타원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 고혈압
2. 고혈압의 치료요법으로서, 고혈압을 가진 제2형 당뇨병 환자의 신장병

※【용법·용량】

이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있지만 매일 같은 시간에 복용할 것을 권장한다.

1. 고혈압

- 1) 성인
초회량과 유지량은 로사르탄칼륨으로서 1일 1회 50mg 경구투여 하는 것이 권장된다. 치료 시작 후 3~6주 후에 최대 혈압 강하 효과가 나타난다. 치료효과가 불충분한 경우 같은 용량을 1일 2회로 분할 경구투여하거나 필요할 경우 1일 1회 100mg까지 증량할 수 있다.
- 2) 6세 이상의 소아 및 청소년
(1) 체중이 20kg 이상 50kg 미만으로 정제를 삼킬 수 있는 환자
초전용량은 이 약으로서 1일 1회 25mg이며, 환자의 혈압 반응에 따라 최대 1일 1회 50mg까지 증량할 수 있다.
(2) 체중이 50kg 이상인 환자
보통 이 약으로서 1일 1회 50mg이 권장되며, 환자의 혈압 반응에 따라 최대 1일 1회 100mg까지 증량할 수 있다.
(3) 6세 미만 소아환자, 사구체여과율이 30mL/min/1.73㎡ 미만인 소아 환자, 간장애 소아환자에게 권장되지 않는다.
- 3) 이 약 단독으로 혈압이 조절되지 않는 경우 다른 고혈압 치료제에: 저용량의 이노제와 병용투여 할 수 있다.
히드로클로로티아지드와 병용투여 시 상가작용이 나타난다.

2. 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병

- 1) 성인
초회량과 유지량은 로사르탄칼륨으로서 1일 1회 50mg이다. 혈압에 따라 1일 1회 100mg까지 증량할 수 있다. 그러나 과도한 혈압강하의 우려가 있는 환자에게는 초회량으로 25mg이 권장된다. 이 약은 인슐린, 당뇨되는 혈당강화제(예: 설폰닐우레아, 글리타존, 글루코사이드제 억제제)와 병용 투여할 수 있다.

3. 특수 환자군

- 1) 고령자
75세 이하의 고령자에 있어 초회량 조절은 필요하지 않으며, 75세가 넘는 고령자의 경우 초회량은 이 약으로서 1일 1회 25mg을 권장한다.
- 2) 신장애 환자
(1) 크레아티닌청소율 20~50mL/min: 초회량 조절은 필요하지 않다.
(2) 크레아티닌청소율 <20mL/min과 투석 중인 환자: 초회량은 이 약으로서 1일 1회 25mg을 권장한다.
- 3) 혈관내 유류 혈액량 감소 환자
혈관내 유류 혈액량 감소(Intravascular volume depletion) 가능성이 있는 환자(예: 이노제로 치료중인 환자)의 초회량은 이 약으로서 1일 1회 25mg을 권장한다(사용상의 주의사항 항 참조).
- 4) 간장애 환자
간장애 병력 환자들은 소량 투여를 고려해야 한다. 중증 간장애 환자에게 투여하지 않는다.

※【사용상의 주의사항】

1. 경고

임부에게 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 직접 작용하는 약물들의 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지도 일어날 수 있다. 양수과 소수의 발생은 태아의 폐 형성 저하증 및 골격 기형과 관련이 있을 수 있다. 신생아에게 나타난 기능성이 있는 부작용은 두개골 형성 저하증, 당뇨증, 저혈압, 신부전, 사지 마비 등을 포함한다. 임신이 확인되면 가능한 빨리 이 약을 중단해야 한다(7, 임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조).

2. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 중증의 간장애 환자
 - 4) 유전성 혈관부종 환자이거나, ACE억제제 혹은 안지오텐신 II수용체 차단제 치료시 혈관부종의 병력이 있는 환자
 - 5) 원발성 고알도스테론증 환자
 - 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
 - 7) 당뇨병이나 중증도~중증의 신장애 환자(사구체여과율 <60mL/min/1.73㎡)에서 알리스카텐 함유제제와의 병용
3. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.
- 1) 고령자
 - 2) 고혈압합증 환자 혹은 혈청 칼륨치가 높아지기 쉬운 환자
 - 3) 경증~중증도 간장애 환자
 - 4) 대동맥판 및 승모판 협착증 환자 혹은 폐쇄비대성심병 환자
 - 5) 허혈 심장병, 허혈 심장혈관 질환, 뇌혈관 장애 환자(과도한 혈압강하는 심근경색이나 뇌혈류 부전으로 인한 뇌졸중을 일으킬 수 있다.)
 - 6) 혈관내 유류혈액량 감소환자(예: 이노제 투여중인 환자, 엄격한 염분제한 환자, 혈액투석중인 환자, 설사 혹은 구토 환자)
 - 7) 양측성 혹은 편측성 신동맥 협착증이 있는 환자
 - 8) 중증의 신장애 환자
 - 9) 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 이중차단: 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE억제제, 또는 알리스카텐 등 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)에 영향을 미치는 다른 약제와의 병용은 권장되지 않는다.

4. 이상반응

- 1) 이 약은 보태성 고혈압 성인 환자 3,300명 이상을 포함하여 전체 4,058명의 임상시험 대상자에서 안전성이 평가되었다. 1,200명 이상의 환자는 6개월 이상 투여받았고, 800명 이상의 환자는 1년 이상 투여받았다. 일반적으로 이 약은 내약성이 우수하였다. 전체적인 이상반응 발현율은 시험군과 대조군 사이에 큰 차이가 없었다.

대조 임상시험에서 임상적 이상반응으로 인하여 투여를 중단한 경우는 로사르탄군의 경우 2.3%였으며, 위약군의 경우 3.7%였다.

- (1) 다음 표는 6~12주 동안 실시한 4건의 위약대조 임상시험에서, 1,000명 이상의 시험대상자는 로사르탄(10~150mg)을, 300명 이상은 위약을 투여받았을 때의 이상반응 발현율을 정리한 것이다. 이상반응 발현율은 로사르탄 투약 용량의 변화에 거의 영향을 받지 않았으므로 로사르탄의 각 용량군에서 보고된 이상반응을 통합정리하였다. 이 표에서 제시된 이상반응은 로사르탄군의 발현율이 1% 이상으로서 위약군보다 빈도가 높은 것들이다.

	로사르탄 발현율(%) (n=1,075)	위약 발현율(%) (n=334)
근경련	1	0
근골격계 요통	2	1
허저통	1	0
정신신경계	3	2
비충혈	2	1
호흡기계 상기도감염	8	7
부비동염	1	0

- (2) 다음 이상반응은 로사르탄군에서 발현율 1% 이상이었던 위약군의 발현율에 로사르탄군과 유사하거나 높은 이상반응이다.
 - 소화기계: 구역, 설사, 소화불량
 - 호흡기계: 기침, 부비동장애, 인두염
 - 근골격계: 근육통
 - 정신신경계: 불면, 두통
 - 전신: 무력/피로, 부종/팽윤, 복통, 흉통이상반응의 발현율은 남녀, 연령, 인종간에 차이가 없었다.
- (3) 아사피린, 페니실린에 대해 과민반응 환자에 이 약을 투여하였을 때 입술, 눈꺼풀의 팽윤, 얼굴발진 등의 혈관부종으로 인해 투여를 중지하였으나 중지 후 5일 이내에 정상으로 회복되었다.
- (4) 한 명의 시험대상자에게서 소변의 낮은 각질이 발견되고 용혈현상이 나타났다.
- (5) 임상에서 얻어진 이상반응 외에 임상시험중 발현율이 1% 미만이거나 2명 이상의 시험대상자에서 보고된 이상반응으로서 잠재적으로 중요한 이상반응의 목록은 다음과 같다. 이 이상반응이 투여약과 관련이 있는지의 여부는 확인되지 않았다.
 - 전신: 열감부종, 발열, 기침성 효과, 실신
 - 심혈관계: 협심증, 2도 방실차단, 뇌혈관사고(CVA), 저혈압, 심근경색, 심방세동 등 동반하는 부정맥, 심계항진, 동시맥, 빈맥, 심실성 빈맥, 심실세동
 - 소화기계: 식욕부진, 변비, 치통, 구강건조, 방귀, 위염, 구토
 - 혈액계: 빈혈
 - 대사계: 통풍
 - 근골격계: 상지통, 고관절부 통증, 관절팽윤, 무릎통증, 근골격 통증, 어깨 통증, 근강직, 관절통, 관절염, 섬유근통, 근육력
 - 정신신경계: 불안, 불안장애, 운동실조, 혼란, 우울, 양분, 양분, 감각각각, 성취감각, 기억력장애, 편두통, 신경과민, 감각이상, 말초신경병증, 중환자, 수면장애, 기면, 진전, 어지럼
 - 호흡기계: 호흡곤란, 기관지염, 인두부종, 비충혈, 비염, 호흡기질환, 흉부부종
 - 피부: 발진, 피부부종, 피부건조, 반상출혈, 흉반, 홍조, 광민감반응, 가려움, 발진, 발한, 두드러기
 - 특이감각: 호르몬이, 기관지염, 인두부종, 비충혈, 비염, 호흡기질환, 흉부부종
 - 비뇨기계: 방귀부전, 뇨증, 빈뇨, 요도감염

- 2) ACE억제제로 인한 지속적인 마른기침이 보고된 바 있으며, 이로 인하여 ACE억제제의 투여를 중단할 수 있다. 2건의 평행그룹, 이중맹검, 무작위, 대조 시험에서 ACE억제제를 투여받아 기침이 유발되었던 환자에게 이 약을 투여하였을 때, 기침 유발에 미치는 영향을 평가하였다. 리시노프릴을 투여받았을 때 ACE억제제로 인한 기침이 유발되었으며 위약을 투여받았을 때는 기침이 사라진 환자들을 이 약 50mg군, 리시노프릴 20mg군 그리고 위약군(n=97) 혹은 히드로클로로티아지드군(n=135)으로 무작위 배정하였다. 이중맹검으로 8주간 투여하였다. 기침의 발생률은 다음 표와 같다.

임상시험 ¹⁾	히드로클로로티아지드	이 약	리시노프릴
기침	25%	17%	69%
임상시험2 ¹⁾	9%	이 약	리시노프릴
기침	위약	29%	62%

¹⁾연구통계=(89% 백인, 64% 여성)

²⁾연구통계=(90% 백인, 51% 여성)

두 시험결과, ACE억제제로 인해 기침이 유발되었던 환자에게 이 약을 투여하였을 때 기침의 재발률은 히드로클로로티아지드 혹은 위약과 유사하였다.

양성 재발률을 비롯하여 기침은 이 약의 시판 후 조사에서 보고되었다.

3) 아사 환자

소아 환자에서 나타난 이상반응 프로파일 이전에 보고된 성인 환자의 이상반응 프로파일을 비교한 결과 유의한 차이는 없었다.

4) 좌심실 비대가 있는 고혈압 환자

좌심실 비대가 있는 고혈압 환자를 대상으로 로사르탄이나 아테놀롤을 투여하였을 때 심혈관장애에 대한 영향을 알아보기 위한 장기 임상시험(Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension, LIFE study)에서 나타난 이 약에 대한 이상반응은 이전에 고혈압 환자에서 보고되었던 이상반응과 유사하였다.

- 5) 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병
안지오텐신 II수용체 차단제인 이 약에 의한 인슐린-비의존성 당뇨병의 평가항목의 감소율 연구한 시험(Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan, RENAAL study)에서 1,513명의 환자가 이 약 혹은 위약을 투여 받았으며, 장기 임상시험에서 보고된 이상반응의 발생률은 두 군간 차이가 없었다. 이상반응으로 인하여 투여를 중단한 비율도 유사하여(시험군 19%, 위약군 24%) 이 약은 일반적으로 내약성이 우수하였다. 약물과의 관련성과 관계없이 이 약을 투여 받은 환자의 4% 이상에서 보고되었으며 위약군보다 더 빈번하게 보고된 이상반응은 다음 표와 같으며, 이들은 배경요법으로 다른 혈압강화제를 함께 투여 받았다.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ks)나 제품상담 전용전화를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mids.go.kr)'을 참조하십시오.
- 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약품안전관리원에 할 수 있습니다. **신청방법 ☎ 1644-6223, 14-3330** **☐ karp.drugsale.or.kr** **신청대상** 의약품부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족 **보상범위** 사망/일시보상금, 장애비, 장애일시보상금, 진료비



2010. 9. 4. 작성
※2024. 5. 22. 개정
(Ver.013)

	이 약과 다른 혈압강하제 투여 %(n=75)	위약과 다른 혈압강하제 투여 %(n=762)
전신		
머리/피로	14	10
홍통	12	8
발열	4	3
감염	5	4
인플루엔자질환	10	9
외상	4	3
심혈관계		
저혈압	7	3
기립저혈압	4	1
소화기계		
설사	15	10
소화불량	4	3
위염	5	4
내분비계		
당뇨병성 혈관질환	10	9
눈, 귀, 코 인후		
부비동염	6	5
혈액계		
빈혈	14	11
대사계/영양계		
고칼륨혈증	7	3
저혈당증	4	3
체중증가	4	3
근골격계		
요통	12	10
하지통	5	4
무릎통	5	4
근무력	5	4
신경계		
감각감퇴	5	4
호흡기계		
기관지염	10	9
기침	11	10
피부계		
조직적염	7	6
비뇨기계		
요도감염	16	13

6) 다른 이상반응들이 시판 후에 추가로 보고되었다.

- (1) 고빈도성 혈관부종(기도 폐쇄를 야기할 수 있는 후두/성문의 팽윤, 열공/입술/인두/혀의 팽윤)이 이 약을 투여받은 환자에서 드물게 보고되었으며, 이들 이상반응을 받은 환자들은 이전에 ACE억제제 등의 다른 약물에 대해서도 혈관부종을 경험한 적이 있었다. 혈관염(henoch–Schönlein purpura)이 보고된 적이 없다. 또한 이나비말릭산염 함유군(불대환, 구강 이상 농도, 위염, 두드러기, 호흡 곤란, 전신 홍조, 부종 등)이 중증으로 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 한다.
- (2) 소화기계: 간기능 이상, 드물게 간염 (3) 전신 및 투여부위: 권태
- (3) 혈액계: 빈혈, 드물게 혈소판 감소증
- (4) 근골격계: 근육통, 무력감, 근육경직, 인플루엔카나이즈(CX) 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 횡문근융해가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 또한 횡문근융해에 의한 근육 신부전의 발병에 주의한다.
- (5) 대사계: 마리아시 (7) 호흡기계: 폐렴 기침 (8) 피부: 홍색피부부종
- (6) 신장 및 영양: 고칼륨혈증 및 저나트륨혈증이 이 약 단독제제를 투여 받은 환자에서 보고된 적이 있다. 또한 심각한 고칼륨혈증 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.
- (7) AIT의 증상이 드물게 일어나며, 투여 중단시 대개 없어진다.
- (8) 대조임상시험에서 이 약에 의해 표준검사치와 임상적으로 유의한 정도로 변동된 시판에는 드물게 발생했다.

- (1) 크레타이딘, BUN: 이 약을 단독투여받은 본태성 고혈압 환자 중 0.1% 미만에서 BUN 또는 혈청 크레타이딘치가 약간 증가하였다.
- (2) 헤모글로빈 및 헤마토크리치가 이 약을 단독투여한 환자 중 5%에서 헤모글로빈 및 헤마토크리치가 약(2.4%, 0.09%)로 감소하였다
- (3) 간기능: 간효소 상승은 없었다. 빈혈로 인하여 투여를 중단한 예는 없었다.
- (4) 간기능 검사: 간효소 또는 혈청 빌리루빈이 때때로 상승하였다. 이 약을 단독투여한 본태성 고혈압 환자 중 1%가(< 0.5%)는 27간 기능 검사치 이상으로 투여를 중단하였다.
- (5) 실신, 의식상실: 혈압강하에 동반하는 일과성 소크증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 차가운 손, 구토, 의식상실 등의 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 특히 혈액 투석 임박한 경우 제 환자에게도 이와 혈압 강하제 투여중인 환자에서 자용하여서 투여를 시작하고 중환자는 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 사서한다.
- (6) 금식 간염, 전격성 간염이 나타날 수 있으므로 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- (7) 신부전: 나타날 수 있다.
- (8) 심실성 기외수축, 심방세동 등의 부정맥이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 즉시 적절한 처치를 한다.
- (9) 저혈당증: 당뇨병 환자에서 나타나는 저혈당이 쉬움(이) 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 무력감, 근육감, 식은땀, 소변열, 진동적 저하, 경련, 의식 장애 등이 나타난 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

5. 일반적 주의

- (1) 간헐변증 환자의 혈청 로사리탄 농도가 현저히 상승되었다는 보고가 있으므로, 27간 기능 장애가 있는 환자들은 소량 투여를 고려한다.
- (2) 안지오텐신Ⅱ 수용체 차단제 투여 중 드물게 간염 등의 심각한 간장애가 나타났다는 보고가 있다.
- (3) 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 대한 영향의 결과, 신부전을 포함한 신기능의 변화가 보고되었다. 이러한 신기능의 변화는 투여 중단시 정상으로 회복되었다.
- (4) 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 의존적인 약물의 경우(예: 중증의 질염심부전 환자), ACE억제제를 투여하였을 때 신기능 및/혹은 진행성 질염심부전이 보고되었으며, (드물게) 급성 신부전 및/혹은 사망이 보고되었다. 유사한 결과가 이 약을 투여한 환자에서도 보고되었다.
- (5) ACE억제제와 양성성 혹은 편측성 신동맥 협착증을 갖는 환자의 혈중요소와 혈청 크레타이딘치를 상승시켰다는 보고가 있다. 이 약을 투여한 환자에서도 유사한 결과가 보고되었다. 이는 투여 중단 시 회복되었다. 또한 이들 환자에게 신혈류량의 감소와 신구체 여러단위 저하에 의해 급속 신기능을 악화시킬 우려가 있고, 저혈압을 일으킬 수 있다.
- (6) 중증의 신장애 환자에게 이 약 투여시 고칼륨혈증이 나타날 수 있다. 또한 신기능의 악화가 어려울 우려가 있으므로 혈청 크레타이딘이 2.5mg/dL 이상의 경우에는 투여량을 줄이는 등 신중히 투여한다.
- (7) 전해질 불균형은 당뇨병 환자 상관없이 신장애 환자에서 빈번하게 발생하므로 반드시 알아야 한다. 당뇨병을 동반한 2형 당뇨병 환자를 대상으로 실시된 임상시험에서 고칼륨혈증이 위약군에 비하여 시험군에서 더 많이 보고되었다. 그러나 고칼륨혈증으로 인하여 투여를 중단한 환자는 드물었다(4. 이상반응 항 참조).
- (8) 고칼륨혈증(혈청 칼륨>5.5mmol/L)이 1.5%의 환자에서서 발생하였다. 약물 투여를 중단할 정도는 아니었다. 고칼륨의 신장장애 환자들은 혈청 칼륨을 검사 받아야 한다. 특히 심부전 환자와 크레타이딘농도가 30~50mL/min인 환자의 경우. 혈청 칼륨 농도 및 크레타이딘농도를 주기감에 관찰해야 한다. 신장애, 당뇨병 등에 의해 혈청 칼륨치가 높지하기 쉬운 환자에서는 고칼륨혈증이 발생할 확률이 더 크므로 혈청 칼륨치에 주의한다. 또한 고칼륨혈증 환자에서 고칼륨혈증을 악화시킬 우려가 있으므로 치료가 필요하다고 판단되는 경우를 포함하여는 사용을 피한다. 혈청 칼륨 농도를 증가시킬 수 있는 다른 약물의 병용은 고칼륨혈증을 일으킬 수 있다. 이 약은 칼륨보존(나트륨-칼륨공동수송) 칼륨을 포함한 염분 대용제가 없는 칼륨 보충제를 증가시킬 수 있는 다른 약물과의 병용투여에는 권장되지 않는다(참조: 상호작용 항 참조).
- (9) 이 약의 투여에 의해(특히, 치료 시, 용량 증량시) 일과성의 혈압강하(소크증상, 의식상실, 호흡곤란 등을 동반)를 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 특히, 혈관내 시료용량률 감소 환자(2, 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 항 참조)에 투여 시 시료용량률 개시하고 중증 시 환자의 상태를 충분히 관찰하여야 한다. 또한 이 약 투여 중에 정지투여로 혈압 모니터링을 실시할 것이 권장된다.
- (10) 심부전 유무와 상관없이 심부전 환자에서 중증의 저혈압이나 신부전증(중증)을 일으킬 우려가 있다. 중증의 신부전을 가진 심부전 환자, 중증의 심부전 환자(NYHA class IV), 심부전 및 생명을 위협하는 심부전병에 기인한 환자들에게 이 약을 투여한 임상시험은 거의 없으므로, 이러한 환자들에게 이 약 투여시 주의해야 한다.
- (11) 고혈압과 단백뇨를 동반하는 2형 당뇨병에서의 당뇨병 신증에 대해 이 약을 투여하는 경우, 혈청 크레타이딘이 이전 검사치와 비교하여 30%또는 1mg/dL이상 증가하는 경우 및 신기능장애의 진행속도가 가속되는 경우에는 감량 혹은 투여중지를 고려한다.
- (12) 수술 전 24시간은 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- (13) 2형 당뇨병에서의 당뇨병 신증 환자는 빈혈이 나타나기 쉬우므로 이 약의 투여중에는 정기적으로 혈액검사를 실시하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 빈혈의 원인을 빈혈에 적절한 처치를 한다.
- (14) 이 약은 신장기능신장애에 대한 신장검증이 없다.
- (15) 완발고알도스테론증을 가진 환자들의 경우 일반적으로 레닌-안지오텐신-알도스테론계를 억제하는 고혈압 치료제에 반응하지 않으므로 이 약을 투여해서는 안된다.
- (16) 혈압강하작용에 의해 야기될, 휘창현상이 나타날 수 있으므로 고작업, 차량운전 및 기구조작 시 주의를 기울여야 한다. 특히 치료 초나 용량 증량시 주의한다.

6. 상호작용

- (1) 히드로콜로리타이드, 디곡신, 와파린, 시메티딘, 페도바인페린 등의 약물과 임상 약동동력학 시험 결과 임상적으로 유의한 약물상호작용은 발견되지 않았다(이 약을 대수 유도제인 페도바인페린)이 있으나 약의 혈장대사치의 AUC를 20% 감소시켰다. 효소 억제제인 시메티딘은 로사리탄의 AUC를 18% 증가시켰으나, 혈장대사제에는 영향이 없었다. 이러한 변화는 임상적으로 유의하지 않은 것으로 판단된다.
- (2) 약물 대사 유도제인 리팜핀은 로사리탄과 혈장대사제의 농도를 40% 감소

시켰다. 사람에서 27간의 CYP3A4 억제제가 연구되었다. 케토코나졸은 정맥 투여한 이 약의 혈장 대사물로 전환되는데 영향을 미치지 않았으며 메트리로마시논은 이 약의 경구투여 후 임상적으로 유의한 영향을 주지 않았다. CYP2C9의 억제제인 톨루코나졸은 혈장대사체의 농도를 약 50% 감소시키고 로사리탄의 농도는 증가시켰다. 이 약과 CYP2C9 억제제의 약력학적 상호작용은 연구된 바 없다. 이 약을 혈장 대사체로 대사하지 못하는 사람은 CYP2C9에 회귀하여 특정 결함이 있는 것으로 나타났다. 이 결과로 이 약이 혈장대사체로 전환되는데 있어 주요한 역할을 하는 효소는 CYP3A4가 아닌 CYP2C9임을 알 수 있다. 이 약과 아세노쿠마롤(acenocoumarol) 및 펜토프로민(phenprocoumon)을 비롯한 경구용 항응고제의 잠재적인 상호작용은 연구된 바 없다.

- (2) 안지오텐신Ⅱ를 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 칼륨보존이노제(예: 스피로노락톤, 트리아메텐, 아미로리드), 칼륨 보충제, 칼륨을 함유한 염분 대용제 또는 혈청 칼륨 농도를 증가시킬 수 있는 다른 약물(예: 헤파린, 트리메토프릴 함유우레아제의 병용은 혈청 칼륨 농도를 증가시킬 수 있다. 따라서 이 약과의 병용이 권장되지 않는다).
- (3) 비스테로이드염진통제(NSAID): 안지오텐신Ⅱ수용체 차단제와 비스테로이드염진통제에 선택적인 COX-2억제제, 시메티탄/산소> 3g/day)나 비선택적 비스테로이드염진통제와 병용시 혈압강하효과가 감소할 수 있다. ACE억제제와 같이, 안지오텐신Ⅱ수용체 차단제와 비스테로이드염진통제의 병용은 신기능을 악화, 급성 신부전을 유발시킬 수 있고, 혈청 칼륨을 증가시킬 수 있다. 병용시 주의해야 하며, 특히 고령자 혹은 용혈혈색소 감소환자(이제) 중증 환자를 포함는 주의한다. 병용치로 시작 후 환자에게 적절한 방식으로 공급되어야 하며, 신기능을 주기적으로 모니터링 해야한다.
- (4) 나트륨 배설에 영향을 미치는 다른 약물과 마찬가지로, 이 약 투여시 리튬 배설이 감소되고 리튬 중독이 나타날 수 있다. 따라서 안지오텐신Ⅱ수용체 차단제와 리튬을 병용시 혈청 및 리튬 농도를 모니터링해야 한다.
- (5) 이 약과 혈압강제를 일으킬 수 있는 약물(삼한제 함유우제, 항성신병약, 바클로펜, 마이오스틴)을 병용투여하는 경우 저혈압의 위험이 커질 수 있다.
- (6) 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), ACE억제제 또는 알리스카렌의 병용투여에 의한 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAS)의 이중작용에 이러한 약물의 단독요법과 비교시 저혈압, 실신, 고칼륨혈증 및 신기능의 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있다. 이 약과 RAAS에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우, 혈압, 신기능 및 전해질을 면밀히 모니터링해야 한다. 당뇨병이나 중증증-중증의 신장애 환자(사구체여과율 <60mL/min/1.73m²)에게 이 약과 알리스카렌 함유우제를 병용투여하지 않는다.
- (7) 자몽주스는 CYP450를 저해하는 성분을 함유하고 있어 이 약의 혈장 대사 산물 농도를 낮추지 치료효과를 저하시킬 수 있다. 따라서 이 약 복용 시 자몽주스를 섭취하지 않도록 한다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- (1) 임부: 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 직접적으로 작용하는 약물군은 발달 단계의 태아의 손상 및 사망까지도 초래할 수 있다. 로사리탄은 임신 중에 사용되는 안되며, 임신이 확인되면 가능한 빨리 투여를 중단한다. 사람의 경우, 태아의 신장 관련는 레닌-안지오텐신계의 발육과 관련 27기에 시작되므로, 이 약을 임신 2~37에 복용하였을 때 태아의 위험성이 있다. 임신 2, 37기 사이에 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 직접 작용하는 약물을 투여한 환자에서 태아 및 신장과의 저혈압, 고칼륨혈증, 신생아 두개골형상저하증, 요관소 그리고/혹은 무호흡, 기적적으로 네 기격적 신부전, 자궁내 손상 지체 및 신장을 포함하여 태아 및 신생아 손상과 연관성이 있었다. 태아 신기능 감소 때문인 것으로 추측된 양수과소증 보고 되었고, 양수과소증은 태아 신기능, 두개안면 기형 및 폐정성 저하증과 연관성이 있었다. 또한 이 약에 의한 것인지 명확하지 않지만, 미숙, 자궁내 발육지연, 동맥관 협착증이 나타났다는 보고가 있다.

역학적으로는 임신 17에 ACE 저해제에 노출된 경우 최기형성 위험에 대한 증거는 명확하지 않다. 어느정도의 위험성 증거를 배제할 수 없다. 안지오텐신수용체차단제의 위험성에 대해 불확실한 역학자료는, 이 계열 약물들에 유산한 정도의 위험성이 나타날 수 있다. 임신 기간동안 임부의 고혈압을 적절히 관리하는 것은 임부와 태아 모두에게 최화적인 결과를 주는데 중요하다.

드물지만 레닌-안지오텐신계에 영향을 미치는 약물에 대한 적절한 대체약물이 없는 경우(대부분 전령의 임부 중 한명 골 하혈을 발한 임부에게 태아에 대한 잠재적 위험을 인지시켜야 하며, 만약 내 회환을 확인하기 위해 일련의 초음파 검사를 실시하여야 한다. 양수과소증이 관찰될 경우, 임부의 생명을 구하기 위한 경우를 제외하고는 이 약의 투여를 중단하여 한다. 임신 주수에 따라서 수축속도검사(Contraction Stress Testing), 비바하 검사(Non-stress Test) 혹은 생물의학적 프로파일링(Biophysical Profiling) 등의 검사가 정상일 수 있다. 하지만 태에게 이미 기격적 장애가 발생한 이후에도 양수과소증이 나타날지 알 수 없다.

- (2) 유아: 내에서 안지오텐신Ⅱ수용체 차단제에 노출된 적이 있는 신생아, 영·유아의 경우에는 전령, 소변산소증 및 고칼륨혈증이 나타나는 것일 면밀하게 관찰하여야 한다. 만약 소변산소증이 나타나지 않으면, 혈압 및 신장 기능에 대한 직접적인 평가를 해야 한다. 저혈압을 회복시키고 저하된 신기능을 대항하기 위해 교환수혈이나 투석할 수 있다.
- (3) 이 약은 젖의 태자 및 새끼에서 체중 감소, 육체/행동 발달 지연, 사망률 및 신장독성을 포함한 이상반응을 유발시켰다. 신생아에게서 체중증가를 감소(10mg/kg/day의 낮은 투여용량에서 영향 받은 것임을 제외하고는), 이러한 이상반응들이 발생한 것은 25mg/kg/day를 초과한 투여용량에서였다(mg/m²에 근거하여 사람의 최대 권장용량인 100mg의 약 3배에 해당함). 이러한 이상반응들은 임신말기 및 수유 중 약물의 노출에 기인한 것이다.
- (4) 수유부: 이 약이 모유 중에 분비되는지의 여부는 밝혀지지 않았으나 젖에 대한 실험적 연구 중에는 이 약의 분비가 확인되었고도 수유부가 이 약을 사용하는 것은 바람직하지 않다. 수유중인 여성에게 이 약의 투여를 피하고, 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중단해야 한다.

8. 소아에 대한 투여

6세 미만의 소아(한지, 사구체 여과율이 30mL/min/1.73m² 미만인 소아 및 청소년 환자에서 이 약의 혈압강하작용에 대한 자료는 없습니다. 투여하지 않는다.

9. 고령자에 대한 투여

고혈압에 대한 대조 임상시험에서 이 약을 투여 받은 환자들 중에서 391명의 환자(19%)가 65세 이상이었으며, 그 중 37%(7%)는 75세 이상이었다. 낮은 체중이 있는 2형 당뇨병 환자의 신장 보호에 관한 대조 임상시험에서 249명(33%)의 환자가 65세 이상이었다. 좌심실 기능에 있는 고혈압 환자에 대해 실험한 시, 뇌졸중, 심근경색의 복합 위험도 감소를 확인하기 위한 대조 임상시험에서 2,857명(62%)의 환자가 65세 이상이었으며 808명(6%)의 환자가 75세 이상이었다. 유호성 및 안전성에 있어서 이 고령자들과 젊은 환자 사이에 전반적인 차이는 없었다. 몇몇 고령자들의 감수성의 증가를 배제시킬 수 있다.

10. 과량 투여에 대한 조치

마우스와 랫트에 각각 1,000mg/kg, 2,000mg/kg/mg/m²에 근거하여 사람의 투여 최대 용량의 각각 44배, 170배를 투여하였을 때 유익적인 치사율이 관찰되었다. 사람을 대상으로 한 과량 투여 자료는 거의 없다. 과량 투여시 나타날 것으로 예상되는 증상은 저혈압과 빈맥이며 부교감(미주신경)의 자극으로 인해 사맥이 증가할 수 있다. 유증상 저혈압이 일어날 경우, 그 때 따른 치료가 이루어져야 한다. 치료는 복용시간, 증상의 유형 및 중증도에 따라 달라진다. 심혈관통계를 안정화시키는 것이 가장 우선적이다. 경구투여시 충분한 양의 약용탄을 투여하는 것이 권장되며, 활성 현물을 면밀히 모니터링하여 필요시 소지한다. 로사리탄 또는 활성 대사물은 혈액 투석으로 제거되지 않는다.

11. 환자에게 제공되어야 할 정보

- (1) 임신: 가임기 여성에게는 임신 중 이 약에 노출 시 나타날 수 있는 위험성에 대해 알려주어야 하며, 임신을 계획하고 있는 경우 치료여부에 대하여 환자와 상담하여야 한다. 환자가 임신하게 되면 즉시 의사와 상의하도록 한다(7, 임부 및 수유부에 대한 투여 항 참조).
- (2) 칼륨보충제: 이 약을 복용하는 환자는 의사와 상의하지 않고 칼륨보충제에 칼륨을 함유하는 염분 대용제를 복용하지 않도록 한다(참조: 상호작용 항 참조).

12. 반 및 취급상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- (2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고안전이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

13. 약용물질등시험 정보 ^{*)}

기, 시험약 로사리탄칼륨정100mg(에스케이제미칼주)과 대조약 교과정100mg(로리탄칼륨)(한국염제대(주))를 2×2 교과시험으로 각 1명의 건강한 성인에게 공복 시 단회 교과투여하여 56명의 혈중 로사리탄칼륨을 측정한 결과, 비교평가항목치 AUC₀₋₂₄를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 치의 90% 신장치인 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물동등성도 동등성을 입증하였다.

구분		비교평가항목	참고평가항목		
		AUC _{0-24h} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr) t _{1/2} (hr)	
대조약 (한국염제대(유))	코자정100mg (로사르틴칼륨)	963.9±286.2	779.3±368.5	1.00 (0.5~5.0)	1.55±0.47
시험약 (에스케이제미칼주)	코사카정100mg (로사르틴칼륨)	963.3±273.6	823.2±484.9	1.00 (0.25~4.0)	1.48±0.39
90%신뢰구간 ^{*)}		log 0.9607~1.0453	log 0.8624~1.1278	—	—
(기준: log0.8~log1.25)					
(AUC, C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값[범위], n=56)					
AUC: 투약시기부터 최종혈중농도 정량한(17)치의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 ^{*)} 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 치의 90%신뢰구간					

나, 약동물동등성시험기준 제2조제2항에 따라, 시험약 로사리탄칼륨정50mg(에스케이제미칼주)은 대조약 로사리탄칼륨(에스케이제미칼주)의 생물학적 동등성을 시험약을 제출용량에 대한 대조약 용량상에서 동등하였다. 이에 따라 해당 치료로서 생물학적 동등성을 입증하였다. (교과시험에 한함)

[저장방법] 기밀용기, 실온(약~30℃)보관 **[사용방법]** 직접응용기에 별도표기

[포장단위량] 코스카정 30정/병, 300정/병 • 코스카정100mg: 30정/병, 100정/병