

일반의약품  
KGMP적격업체  
분류번호 : 03190

벤포티아민 100mg함유 고함량 기능성  
비타민B 복합제



# 스카이비백 정 SKYB100

비타민 B · C · D · E,  
아연, UDCA

체력저하 · 신경통 · 근육통 · 눈의피로 · 육체피로 · 구내염

## 【원료약품 및 그 분량】 1정 중

### 유효성분 :

시아노코발라민(100배산(시아노코발라민으로서 100㎍))(KP)	100.00mg
리보플라빈(KP)	100.00mg
폴산(KP)	0.10mg
제피아스코르브산(아스코르브산으로서 100mg)(별규)	103.10mg
산화아연(아연으로서 50mg)(KP)	62.50mg
피리독신염산염(KP)	100.00mg
니코틴산아미드(KP)	100.00mg
판토덴산칼슘(칼슘으로서 8.4mg)(KP)	100.00mg
벤포티아민(티아민염산염으로서 72.3mg)(KP)	100.00mg
비오텐(USP)	0.10mg
콜린타르타르산염(USP)	50.00mg
이노시톨(KP)	50.00mg
우르소데옥시콜산(KP)	10.00mg
토코페롤아세테이트(2배산비타민D으로서 10IU)(KP)	20.00mg
감마오리자놀(KP)	10.00mg
콜레칼시페롤과립(비타민D로서 1000IU)(별규)	10.00mg

첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아란산마그네슘, 오파드라이빨간색(200F650003), 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로우스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

## 【성상】 적갈색의 타원형 필름코팅정

### 【효능 · 효과】

#### 1. 다음 경우의 비타민 D, E, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, C의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
  - 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방
  - 다음 증상의 원화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
  - 각기
  - 눈의피로

#### 2. 아연의 보급

【용법 · 용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 식후 복용.

### 【사용상의 주의사항】

#### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육증증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
  - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
  - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
  - 4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요증에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
  - 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아  
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
  - 6) 심장·순환기계기능 장애 환자
  - 7) 신장(콩팥)장애 환자
  - 8) 저단백혈증 환자
  - 9) 강심제를 투여 중인 환자
  - 10) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
  - 11) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우  
구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 위장관(장자)장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 폐부증(부기)
  - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
  - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
  - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
  - 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병작변화)이 나타날 수 있다.
  - 6) 풀산이 부족한 환자에게 비타민 B6를 1일 10mg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
  - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
  - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
  - 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
  - 10) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용(사용))시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
  - 11) 우발적으로 과량복용 한 경우
  - 12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
  - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
  - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
  - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
  - 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
  - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- 【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30°C)
- 【유효기간】 제조일로부터 36개월
- 【포장단위】 60정/병, 120정(60정/병×2)
- 【소비자상담실】 080-021-3131
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
  - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
  - 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
  - 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
  - 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 작성일 : 2019년 12월 16일