

일반의약품
분류번호:[319]



고함량 콘드로이틴 600 mg + 비타민 B·D

복합 관절 영양제

에코파워600정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

유효성분:

콘드로이틴설펀레이트나트륨(KP)	600.0mg
리보플라빈부타레이트(KP)	6.0mg
피리독신염산염(KP)	25.0mg
니코틴산아미드(KP)	50.0mg
판토텐산칼슘(KP)	20.0mg
감마오리지놀(KP)	5.0mg
티아민질산염(KP)	60.0mg
콜레칼시페롤과립(비타민D로서 1000IU)(별규)	10.0mg
산화아연(아연으로서 15mg)(KP)	18.7mg
시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 25μg)(KP)	25.0mg

첨가제: D-만니톨, 메타규산알루미늄마그네슘, 스테아르산마그네슘, 오파드라이빨간색(200F650003), 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, D의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기
· 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) · 각기 · 눈의피로 · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방

2. 아연의 보급

[용법·용량] 12세 이상 어린이 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분) 팽만감, 위장관(창자)장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기)
 - 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용[함께 복용(사용)]투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
 - 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30 $^{\circ}$ C)보관
 [사용기간] 제조일로부터 36개월
 [포장단위] 45정/병, 90정(45정/병x2)
 [소비자상담실] 080-021-3131

[판매원] 에스케이케미칼(주) 충청남도 천안시 서북구 용정도하길 215-20
 [제조원] (유)한중제약 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층. 봉동로 705

-
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
 - 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 - 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
 - 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 작성일 : 2019년 11월 06일