

웰비타

연질
캡슐

일반의약품



고단위종합비타민제

비타민은 건강유지, 질병예방, 발육·성장 및 신체 각종 대사와 기능에 필수적이며 미량으로도 탁월한 효과를 가지는 성분입니다. 이러한 비타민은 체내에서 합성되지 않으므로 섭취를 통해서만 보충해 주어야 하는데 현대인은 불규칙적인 식생활, 인스턴트식품, 다이어트 등의 잘못된 식습관으로 충분한 비타민을 공급받지 못하여 만성피로, 신체대사 이상 등에 시달리고 있습니다. 웰비타연질캡슐은 비타민 10여종과 셀레늄(항산화 효과, 노화방지)등의 미네랄을 처방한 멀티비타민제로 과다한 업무와 스트레스에 시달리는 현대인 뿐만 아니라 수험생, 임신·수유기의 여성, 노년기까지 남녀노소에 관계없이 꼭 필요합니다. 1일 1회 복용으로 간편하게 효과를 볼 수 있으며, 연질캡슐 제형으로 비타민의 산화를 방지하며 높은 흡수율과 빠른 효과를 나타낼 수 있는 제품입니다.

【제품명】 웰비타연질캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,420mg) 중

■ 유효성분

레티놀팔미테이트(KP)(비타민A로서 2,300IU)	1,353mg
농축콜레칼시페롤(유상)(BP)(비타민D로서 200IU)	0.20mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 10IU)	10.00mg
티아민·질산염(KP)	1.50mg
리보플라빈(KP)	1.20mg
니코틴산아미드(KP)	15.00mg
판토텐산칼슘(KP)	30.00mg
피리독신염산염(KP)	1.40mg
시아노코발라민 1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 2.5µg)	2.5mg
아스코르브산(KP)	50.00mg
피토나디온5%(별규)(비타민K로서 55µg)	1.10mg
폴산(KP)	250.00µg
비오틴(USP)	20.00µg
셀레늄함유건조효모(별규)(셀레늄으로서 20µg)	15.38mg
침강탄산칼슘(KP)(칼슘으로서 30.03mg)	75.00mg
무수인산수소칼슘(KP)(인으로서 23.22mg, 칼슘으로서 30.05mg, 총 칼슘으로서 60.08mg)	102.00mg
푸마르산철(KP)(철로서 10mg)	30.50mg
산화아연(KP)(아연으로서 5mg)	6.20mg
산화제이구리(KP)(구리로서 0.8mg)	1.00mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 6mg)	10.00mg
황산망간수화물(USP)(망간으로서 0.65mg)	2.00mg

■ 기타 첨가제 : 콩기름, 아자경화유, 황산, 레시틴, 젤라틴, 농글리세린, 비결정성 소르비톨액, 에틸비탈린, 카카오색소, 차차청색소, 산화티탄

【성 상】 적갈색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 정방형 연질캡슐

【용법용량】 12세 이상 어린이 및 성인 1일 1회 1캡슐을 식후 복용

【효능효과】 1. 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)
- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방

【사용상의 주의사항】

1. 경고
 - 1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외)
 - 2) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 월슨병
- 5) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 6) 신장결석 환자
- 7) 심한 증상의 신부전 환자
- 8) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 9) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정되는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

② 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

4) 소화장애, 만성폐양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자

5) 심장·순환기계기능 장애 환자

6) 신장장애 환자

7) 저단백혈증 환자

8) 강심배당체를 투여 중인 환자

9) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자

10) 동풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

11) 신장결석 병력이 있는 환자

12) 임부

13) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 혈장(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유형체를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

① 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절 부종(부기)

② 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 묽은 변

③ 저혈압, 얼굴달아오름, 신바동맥류, 피부발진

④ 두드러기, 광선과민반응, 복부(배부분)·위통증, 경련, 열, 혼수

⑤ 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하

⑥ 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증

⑦ 위·장관(장자)장애, 소화장애, 상복부통증, 폐 부종(부기)

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 피리독신을 1일 500mg ~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에서 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

10) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴)로부터 전환된 것을 제외한 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양성) 위험을 높일 수 있다.

11) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것

12) 우발적으로 과량복용 한 경우

13) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜질 것

2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.

3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.

5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6) 지장과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권 장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 30캡슐(10캡슐/PTP*3)

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(http://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오

※ 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변색, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

※ 자세한 문의는 전화료가 필요없는 고객 상담실을 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료): 080-021-3131

【판매원】



Life Science Biz. 경기도 오산시 남부대로 430-11

【제조원】



알피 바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

2004.06 작성 2020.03.26 개정 개정번호 20200326

※ 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다.