

관절엔

트라스트 페취

파록시кам

일반의약품

분류번호: 264

【원료약품 및 그 분량】 1매 중

- 유효성분: 파록시캄(KP) 48mg
- 기타 첨가제: 디메틸설폐시드, 올레산, 히드로코르티손, 디에틸렌글리콜모노에틸에테르, 폴리소르베이트80, 비닐아세테이트아크릴레이트다중합체 31%액, 비닐아세테이트아크릴레이트다중합체41%액, 트로메타몰, 포비돈, 메타아크릴산디메틸아미노에틸 · 메타아크릴산메틸공중합체, 아크릴레이트접착성필름, 폴리우레탄필름, 실리콘코팅폴리에스터필름

【성상】 갈색의 사각형 점착성 폴리우레탄 필름에 무색 투명한 사각형 폴리에스터 필름이 부착된 패취제

【효능 · 효과】 퇴행성관절염(골관절염), 건조염(힘줄윤활막염), 근육통, 골관절통, 외상(상처)후 동통(통증) 및 골절 치유후의 동통(통증)

【용법 · 용량】

환부(질환부위)에 2일마다 1매씩 부착한다.

단, 목욕이나 샤워 후 또는 땀이 날 경우에는 1일 1매씩 부착할 수 있다.

환부(질환부위)를 깨끗이 하고 건조시킨다. 약면의 박리지를 떼어낸 후 피부에 견고하게 부착시키고 손바닥으로 잘 눌러준다. 특히 패취 가장자리 부분이 잘 붙었는지 확인한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자는 투여하지 말 것.

- 이 약 또는 기타의 피록시캄 제제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 아스피린 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식발작 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(중증 천식발작을 일으킬 수 있다.)
- 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 두드러기, 비염(코염) 및 맥관부종(혈관부기, 혈관부종)을 일으킨 환자
- 14세 이하의 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 기판지 천식 환자(중증 천식발작을 일으킬 수 있다.)

3. 이상반응

- 피부: 때때로 국소의 가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 인설(비늘, 껍질), 습진 · 피부염, 접촉피부염, 홍반(붉은 반점), 드물게 광과민증이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 심할 경우에는 사용을 중지한다.
- 장기간 또는 과랑투여시 전신이상반응으로 구역, 위장관 불쾌감, 호흡곤란, 신부전 및 신증후군 환자에서의 급성 간질성 신염(신장염)이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.
- 피부감염증을 불현성화(겉으로 드러나지 않게) 시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(복용(사용))하고 충분히 관찰하여 신중히 투여한다.
- 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다.
또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 이상반응 발현(드러냄, 드러내보임)에 유의한다.

5. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 임신 3기: 프로스타글란딘 합성저해로 인해 출산이 자연될 수 있으며 출산시 실혈, 신생아 출혈, 태아의 심폐독성(폐동맥고혈압) (동맥관 조기폐쇄를 수반하는 폐고혈압), 신기능저하로 양수과소증을 수반하는 신부전 등이 나타날 수 있으므로 이 시기의 임부에는 사용하지 않는다.
- 임신 1기 및 2기: 동물의 생식실험 결과 태자독성을 발생하지 않았으나 임부에 대한 연구는 아직 밝혀진 바 없다.
- 피록시캄을 경구 투여한(먹는다.) 후 혈중 농도의 약 1%가 모유에서 발견되었다. 모유에서의 주성분 농도와 임상적 관련성은 아직 밝혀진 바 없으나 수유부에는 투여하지 않는다.

6. 소아에 대한 투여

- 미숙아, 신생아, 영아(젖먹이, 갓난아기), 유아 및 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.

7. 고령자(노인)에 대한 투여

- 고령자(노인)에는 이상반응의 발현(드러냄, 드러내보임)에 특히 주의하고 필요한 최소한의 투여로 한정하는 등 신중히 투여한다.

8. 적용상의 주의

- 병변(병에 의한 몸의 변화)이 있는 피부(출혈성 피부질환, 습진, 감염된 병변(병에 의한 몸의 변화), 화상, 상처), 눈 및 점막 부위에는 사용하지 않는다.
- 밀봉붕대부로 사용하지 않는다.
- 피부에 손상이 있을 경우 사용하면 일시적인 자극감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【사용기한】 직접용기에 별도표기

【포장단위】 70g/팩(1매X7), 10매/팩(1매X10), 30매/팩(1매X30)

- 통증 부위에 부착 후 30초 간 손바닥으로 지그시 눌러 주시면 약물이 잘 스며들고 떨어지지 않습니다.



트라스트페취 사용시 주의사항

- 사용 전 사용 설명서를 상세히 읽어보십시오.
- 본 제품은 관절에 적합한 강한 점착력을 가진 제품으로 건조한 피부나 목과 같이 연약한 부위에 사용할 경우 주의하십시오.
- 건조한 피부나 연약한 피부에 부착한 경우에는 미온수에 적당히 불려서 떼는 것이 좋습니다.
- 피부 이상이 있는 경우 즉시 사용을 중지하고 이상부위를 서늘하게 하여 주시고, 의사 또는 약사와 상의하여 주시기 바랍니다.
- 효능 · 효과에 기재된 용도 이외에 임의대로 제품을 부착하지 마십시오.
- 본 제품을 연속적으로 같은 부위에 적용하실 경우에는 개인의 피부 상태를 고려해서 부착하십시오.

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질 · 변색 · 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.

· 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나 제품상담 전용전화를 통하여 확인할 수 있습니다.

· 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

· 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

· 자세한 시항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.

· 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원 의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담 ☎1644-6223 / 피해구제 상담 ☎14-3330에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.