

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1g 중

• 유효성분: 퓨시드산나트륨(KP)20mg(역가)

• 기타첨가제: 세탄올, 유동파라핀, 정제라놀린, 백색바셀린, 농글리세린

【성상】 무색의 반투명한 연고제

【효능·효과】

• 유효균종: 포도구균, 연쇄구균, 코리네파테움, 클로스트리듐

• 적 응 증: 농피증(고름피부증)·농가진(고름딱지증), 감염성습진양피부염, 심상성여드름(보통여드름), 모낭염, 종기 및 농기증, 화농성한선염, 농가진성(고름딱지증성)진, 화상·외상(상처)·봉합(폐합)창·식피창(피부이식 후 생긴 상처)에 의한 2차 감염

【용법·용량】

환부(질환부위)를 깨끗이 하고 1일 1~2회 적당량을 환부(질환부위)에 직접 바르거나 무균거즈에 넓게 펴발라 붙인다. 두꺼운 층에는 적용을 피하며 보통 1주 정도로 투여기간을 제한한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

① 퓨시드산 및 그의 염에 과민반응의 병력이 있는 환자 ② 비감수성균(특히 녹농(푸른고름)균)에 의한 감염환자

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- ① 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현(드러남) 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- ② 감적(과민상태로 만들)될 수 있으므로 충분히 관찰하고 감적(과민상태로 만들)된 증후(가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 종창(부기), 구진, 소수포(물집)등)가 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- ③ 이 약은 높은 투과흡수성을 가지므로 정기간 또는 광범위한 표면에 투여하지 않도록 주의한다.
- ④ 국소사용 시 내성균이 발현(드러남)되면 추후 동일한 항생물질을 경구투여(먹는다, 복용한다.)시 해로울 수 있다. 그러나 대체로 내성균은 단시간내 다시 이 약에 대해 감수성을 갖게 된다.
- ⑤ 반복 투여 및 장기연용(계속복용(사용))으로 인해 비감수성균이 과잉증식할 수 있다. 만일 균교대중이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- ⑥ 안과용으로 사용하지 않는다.
- ⑦ 눈 또는 눈꺼풀과 같은 얼굴 안쪽에 사용하는 것은 적절하지 않다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- ① 입부 및 임신가능한 여성에게 투여 시 이 약은 전신투여 시 태반관문을 통과한다는 보고가 있으므로 국소사용 시 치료 상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- ② 수유부가 유방감염에 이 약을 사용할 경우 신생아에게 흡수될 수 있다.
- ③ 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않고 전신투여 시 유즙으로의 이행이 보고되었으나 국소사용 시 상용량에서는 영어(젖먹이, 갓난아기)에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 미숙아 및 신생아는 간기능이 미숙하므로 정기간 또는 광범위한 표면에 투여할 경우에는 간기능 장애가 나타날 수 있으므로 주의한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것. 일시적인 작열감(화끈감), 때때로 발진, 약한 동통(통증) 및 자극 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 또한 중증(심한증상)의 다리궤양 환자에 적용시 통증이 유발될 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- ① 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- ② 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **【사용기한】** 직점용기에 별도표기 **【포장단위】** 1개/튜브(10g)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/s)나 제품상담 전용전화를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템'(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.
- 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약물안전관리원에 할 수 있습니다. **신청방법** ☎ 1644-6223, 14-33300 / karp.drugsafe.or.kr **신청대상** 의약품부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족 **보상범위** 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비