

액상이라 효과빠른 기침 / 목감기약 목기천



연립캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(430mg) 중

■ 유효성분	
구아이페네신(KP)	37.5mg
노스카핀염산염수화물(KP)	8mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	7.5mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.5mg
트리메토클놀염산염수화물(KP)	1mg

- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호
- 기타 첨가제 : 폴리에틸렌글리콜600, 폴리에틸렌글리콜400, 정제수, 프로필렌글리콜, 젤라틴, 부분탈수유동소르비톨

[성상] 미황색(연노랑) 또는 연녹색의 투명한 액상 내용물이 든 녹색의 투명한 다원형 연립캡슐

[효능·효과] 기침·가래

[용법·용량] 만 15세 이상 : 1일 3회, 1회 2캡슐

[사용상 주의사항]

(1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기) 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

(2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 진해(기침을그치게함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기용약), 진정제 (3) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터해야 한다. 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 놓)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

(4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(소변을 놓)곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면 2)5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

(5) 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 만 7세 이하의 영아(갓난아기), 유아에게는 시럽제를 복용시킬 것 3) 복용시에는 음주하지 말 것 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.

(6) 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) / 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[포장단위] 10캡슐(10캡슐 / PTP×1)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 소손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약물관리안전관리원(1644-6223)
- 설명서 작성일자(2019년 04월 02일) 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자상담실 : 02-2002-9715 · 반품 및 교환처 : 080-021-3131

개정번호 20190402 설명서 작성일 : 2019.04.02


※ 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다.



Life Science Biz.

경기도 오산시 남부대로 430-11

제조사



경기도 화성시 향남읍 제막공단 4길 35-7