

근이완작용+진통작용 머피스펜 정

근육통 / 신경통 / 관절통 / 요(허리)통 / 염좌(뺨)통 / 건통(어깨)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분:
 - 아세트아미노펜(KP) 300mg
 - 클로르록사존(KP) 250mg
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 말크, 산화티탄

[성상] 흰색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

신경통, 근육통, 관절통, 요(허리)통, 염좌(뺨)통, 건통(어깨통증), 근경련(근육경련), 근경직 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제 질환(여러질환)

[용법·용량]

성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복(빈 속)을 피하여 복용한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사와 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 클로르록사존에 과민증 환자
- 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자
- 3) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)후두, 눈꺼풀, 입술 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

4. 복용시 주의사항

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고 되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담 할 것
 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축(손발)이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - 천식이 나타난 경우
- 2) 바로비탈게 약물, 삼한제 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 다음 경우에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심한 간, 신장에(신장장애) 환자
- 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자

6. 부작용

- 1) 과민증 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지 한다. 드물게 알레르기성 피부 발진,

정상충혈(충혈점), 반상충혈(피부에 검보라빛 얼룩점이 생기는 내부충혈), 요변색 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아나필락시스증상이 나타날 수 있다.

- 2) 간장 : 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지한다.
- 3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다.
- 4) 청신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

7. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여한다.

8. 상호작용

알코올이나 중추신경억제제와 병용(함께 복용)투여시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여한다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관 할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기한] 직접용기에 별도표기

[포장단위] 10정/PTP

[제조외리자] 에스케이케미칼㈜ / 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149

[제조사] ㈜레고켐제약 / 경기도 안성시 원곡로 원당로 354

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skochemicals.com)나 제품상담 전용전화(1644-6223)를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.
- 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국요약물관리센터(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

작성일 : 2019. 09. 06
(Ver.001)

(자세한 문의를 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.)

제품상담 전용전화(무료) : 080-021-3131

