

코엔자임큐텐[CoQ10] · 비타민 · 미네랄함유
항산화 종합영양제

모아헬드원정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

레티놀아세테이트과립(비타민A로서 5,000IU)(EP).....	10.0mg
유비데카레논(KP).....	10.0mg
클레칼시페롤과립(비타민D로서 400IU)(별규).....	4.0mg
토코페롤아세테이트2배산(비타민E로서 25IU)(KP).....	50.0mg
제피아스코르브산(아스코르브산으로서 300mg)(별규).....	309.3mg
폴산(KP).....	0.4mg
티아민질산염(KP).....	10.0mg
리보플라빈(KP).....	10.0mg
니코틴산아미드(KP).....	100.0mg
파리독신염산염(KP).....	6.0mg
시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 18μg)(KP).....	18.0mg
판토텐산칼슘(KP).....	30.0mg
푸마르산철(철로서 18mg)(KP).....	54.76mg
산화아연(아연으로서 48mg)(KP).....	60.0mg
황산망간수화물(망간으로서 1mg)(USP).....	3.168mg
황산칼륨(칼륨으로서 5.2mg)(KP).....	11.48mg
셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 18μg)(KP).....	33.35mg

[첨가제(동물유래성분)] 유당(젓당)수화물(소, 우유)

[기타첨가제] 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이빨간색(200F65 0003), 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C 의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
· 눈의 건조감의 완화 · 야맹증(밤에 잘 못보는 증상) · 뼈, 이의 발육불량
· 구루병의 예방
- 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료
- 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외). 2) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젓먹이 4) 고칼륨혈증 환자 5) 혈액소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈(철분 함유제제) 6) 신장(콩팥)결석 환자 7) 이 약은 유당(젓당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)을 일으킬 수 있다. 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장(콩팥) 장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자 9) 알칼리증, 소화성궤양 환자 10) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 11) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 두드러기, 광선과민반응, 복부(배부분)·위통증, 경련, 열, 혼수, 고칼륨혈증, 가스참, 위장통증, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기) 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양성) 위험을 높일 수 있다. 10) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 11) 우발적으로 과량복용 한 경우 12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다. 3) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 60정/병, 120정(60정/병 X 2)

[소비자상담실] 080-021-3131

[판매원] 에스케이케미칼(주) 충청남도 천안시 서북구 용정도하길 215-20

[제조원] (유)한풍제약 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층. 봉동로 705

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)